

CUCARACHA ALEMANA (*blattella germanica*)



También conocida como **cucaracha de cocina**

Aspecto: Color café claro, de 1,2 a 2,1 cm . de longitud, antenas largas. Posee dos marcas longitudinales oscuras en el tórax lo que las distingue de otras clases de cucarachas.

Hábitos: Especie doméstica, desarrolla sus actividades por la noche. Habita en áreas cerradas y especialmente en las que hay alimentos. Es muy común encontrarla en departamentos, hoteles y restaurantes. Pueden ingresar a las viviendas a través de orificios muy pequeños (cañerías de luz, desagües, agujeros en paredes, por debajo de las puertas) o por medio de envases, bolsas de comida, etc. Su alta capacidad adaptativa, alimenticia y de comportamiento coloca a este insecto como uno de los más resistentes a plaguicidas.

Reproducción: La hembra produce una ooteca que contiene entre 18 y 48 huevos cada 20 o 25 días. Las cucarachas recién nacidas atravesarán por 6 o 7 estados ninfales, hasta alcanzar el estado adulto. Este proceso requiere entre 40 y 125 días, dependiendo de las condiciones ambientales y alimenticias. La vida promedio de una cucaracha adulta es de un año.

Alimentación: Comen casi de todo; su principal fuente de alimentos está en la basura.

CUCARACHA AMERICANA (*periplaneta americana*)



También conocida como **cucaracha voladora** o cucaracha del árbol

Aspecto: Miden entre 2 y 4 cm. de largo; poseen antenas largas, alas marrón rojizo. En el macho, las alas sobresalen del abdomen mientras que en la hembra son de la misma longitud que el abdomen.

Hábitos: Se la localiza comúnmente en desagües y cañerías; también en el exterior de casas, debajo de techos, árboles y enredaderas. Prefieren áreas húmedas y sombreadas con temperaturas templadas.

Reproducción: La hembra produce una ooteca que contiene entre 14 y 16 huevos, cada 50 o 55 días. Las cucarachas recién nacidas atraviesan por 9 o 13 estados ninfales, hasta alcanzar el estado adulto. Este proceso requiere entre 160 y 971 días, dependiendo de las condiciones ambientales y alimenticias. En estado adulto, la vida promedio de una cucaracha americana es de 14 meses.

Alimentación: Son prácticamente omnívoras, prefiriendo alimentos en estado de descomposición.

CUCARACHA ORIENTAL (*blatta orientalis*)



También conocida como **cucarachanegra** o **de cañería**

Aspecto: La hembra mide hasta 3,2 cm . Y el macho hasta 2,5 cm . , Son de color café muy oscuro y poseen alas rudimentarias poco funcionales.

Reproducción: La hembra produce una ooteca que contiene entre 14 y 16 huevos, cada 40 o 60 días. Las cucarachas recién nacidas atraviesan por 7 o 10 estados ninfales, hasta alcanzar el estado adulto. Este proceso requiere aprox. 60 días, dependiendo de las condiciones ambientales y alimenticias. La cucaracha adulta vive en promedio unos 14 meses.

Hábitos: Se encuentran en exteriores e interiores donde haya materia orgánica en descomposición; también son localizables en áreas que ofrecen condiciones húmedas como sótanos, desagües, alcantarillas, etc.

Alimentación: Omnívoras; prefieren materia orgánica en descomposición.

Recuerde que el daño que provocan las cucarachas es más importante por la contaminación que generan que por lo que comen. Las cucarachas no son agentes de enfermedades peligrosas o epidémicas; sin embargo, las excretas y los residuos de estas especies provocan enfermedades alérgicas.