

GARRAPATA DEL PERRO (*dermacentor variabilis*)



Aspecto: Se clasifican en dos órdenes: las **garrapatas duras** (Ixodidae) que tienen la cabeza y piezas bucales expuestas y fácilmente visibles desde arriba; en la parte dorsal tiene un escudo o exoesqueleto que cubre casi todo su cuerpo y las **garrapatas blandas** (Argasidae) de cuerpo no muy bien definido y que no poseen exoesqueleto. En estados larvarios poseen 6 patas y 8 en su fase adulta. Si bien son pequeñas, son los miembros de mayor tamaño en la orden acarina y los únicos que se pueden ver sin lupa.

Hábitos: La mayoría de las especies viven gran parte del tiempo en el piso y como no pueden saltar o correr deben subir sobre objetos apropiados para esperar que un huésped pase cerca. Es una plaga casi exclusiva del perro.

Reproducción: Dependiendo de la especie, las hembras adultas depositan entre 5.000 y 10.000 huevos; de acuerdo a factores de temperatura y humedad; las larvas eclosionan en un período que oscila entre 15 días y 3 meses. La hembra tiende a moverse hacia arriba dejando los huevos en grietas y hendijas cerca de los techos.

Alimentación: Se alimentan exclusivamente de sangre de vertebrados, experimentando un importante cambio de tamaño luego de dicha ingesta.